

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION MENSUELLE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.

C. C. P. : LYON 9.430-12

TÉLÉPHONE 37-20-56

ABONNEMENT ANNUEL

15 NF

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région 2ème Supplément au bulletin N° 31 d'Avril 1963

26 Avril 1963

page 58

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER - Les premières contaminations se sont produites entre le 10 et le 20 avril en toutes régions et les taches apparaîtront à partir du 30 avril; d'autre part de très nombreux germes existent encore qui peuvent provoquer de nouvelles contaminations primaires dans les 2 semaines qui viennent. Enfin la croissance des pousses a été très rapide depuis le dernier traitement.

Toutes raisons qui donnent une importance primordiale au prochain traitement qui devra être appliqué en toutes régions avant le 30 avril.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - La fréquence des traitements doit rester assez serrée: 7 à 10 jours.

SEPTORIOSE DU POIRIER - Dans les vergers atteints par cette maladie en 1961 et 1962 les traitements fongicides dirigés contre la tavelure seront également efficaces contre cette maladie.

HOPLOCAMPE DU POMMIER - Les dégâts de cet insecte peuvent revêtir 2 formes différentes:

- pénétration dans le fruit qui ne se signale que par le trou de sortie, rond, net, de 2 à 2,5mm de diamètre lorsque le fruit a la taille d'une grosse bille.
- incision autour du calice qui laisse une cicatrice circulaire autour de l'oeil.

Ces dégâts subissent depuis quelques années une certaine recrudescence dans notre région. Le traitement se place à la chute des pétales et l'on peut utiliser un des insecticides suivants: parathion, roténone, H.C.H., lindane.

HYPONOMEUTE DU POMMIER - Les jeunes chenilles auront bientôt terminé leur activité de mineuses et le dépôt sur le feuillage d'un insecticide de contact ou d'ingestion adjoint au traitement dirigé contre la tavelure permettra d'atteindre les chenilles avant la confection de leurs soies protectrices.

AUTRES RAVAGEURS A SURVEILLER et à traiter dès leur apparition: puceron vert du pommier, puceron cendré du poirier (dentatus), psylles du poirier et du pommier, bryobe (première araignée rouge à éclore au printemps), chenilles et charançons du feuillage.

CULTURES DIVERSES

ANTHRACNOSE DU FRAMBOISIER - Renouveler les traitements à 10-12 jours d'intervalle. Les prochains traitements pourront être efficaces contre les toutes premières contaminations de didymella.

MELIGETHE DU COLZA - Les traitements (voir liste des produits) doivent être appliqués au plus tard à l'ouverture des premières fleurs.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A. PITHIoud

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles
P. LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L. BOUYX

P 357